

Covid-19: een nieuw risico waarmee rekening dient gehouden te worden bij de hulpverlening binnen het bedrijf

Het Covid-19 virus is een nieuw biologisch agens waarmee rekening dient gehouden te worden bij de hulpverlening. Hierbij kan besmetting in twee richtingen gebeuren: van slachtoffer naar hulpverlener, maar ook van hulpverlener naar slachtoffer.

Dit heeft implicaties naar wie de hulpverlening uitvoert en hoe deze gebeurt.

Wie mag tijdens de Corona-periode geen hulpverlening doen?

Er wordt **geen hulpverlening** gedaan **door** personen die:

- tot een risicogroep behoren:
 - o Personen ouder dan 65 jaar
 - o Personen met ernstig overgewicht (BMI > 40) zonder diabetes en verhoogde buikomtrek
 - o Personen met slecht geregelde diabetes
 - o Personen met ernstige hart- long- of nieraandoeningen
 - o Personen met gedaalde immuniteit (door medicatie, ziekte, ...)
 - o Personen behandeld met chemotherapie en/of bestraling
- zich ziek voelen

Pas de bestaande risicoanalyse aan en voorzie (naast wegwerphandschoenen) volgende bijkomende PBM'S

- **gelaatsbescherming** voor hulpverleners
- **chirurgische maskers** voor slachtoffers

Basisprincipes voor hulpverlening tijdens covid --19

- **Beschouw elk slachtoffer als Covid-19-besmettelijk**
- **Start niet met de hulpverlening als uw veiligheid niet kan gegarandeerd worden:**
 - o indien mogelijk: 1.5 meter afstand houden
 - o indien afstand houden niet mogelijk:
 - Slachtoffer :
 - (chirurgisch) mondmasker
 - Hulpverlener
 - Wegwerphandschoenen
 - Gelaatsbescherming: steeds combinatie van mond-neusbescherming en oogbescherming
 - o Mondmasker + veiligheidsbril
 - o Vizier
 - o indien geen handschoenen en maskers beschikbaar
 - bel 112

Reanimatie + AED

Indien geen gelaatsbescherming beschikbaar:

- ***niet starten met reanimatie***
- ***onmiddellijk 112 bellen***

Vaststellen of slachtoffer nog ademt: enkel door kijken of borst beweegt

Indien 1 hulpverlener

1. 112 bellen
2. gelaatsbescherming (+ handschoenen) aandoen
3. slachtoffer (chirurgisch) mondmasker aandoen
4. ENKEL borstcompressies toepassen; GEEN beademing

Indien 2 hulpverleners (niet meer !)

- beide hulpverleners doen PBM's aan.
- eerste start reanimatie zoals hierboven beschreven
- tweede belt 112 en neemt plaats aan voeteinde van slachtoffer om eerste af te lossen voor borstcompressies

Gebruik AED

1. gelaatsbescherming (+ handschoenen) aandoen
2. slachtoffer (chirurgisch) mondmasker aandoen
3. verder normale procedure AED volgen

Levensreddende handeling

Respecteer de basisprincipes.

Indien geen handschoenen en maskers beschikbaar:

- *niet starten met hulpverlening*
- *onmiddellijk 112 bellen*

Geen levensreddende handeling

Respecteer de basisprincipes.

- beperk het aantal personen bij de interventie
- de interventie gebeurt bij voorkeur in het EHBO-lokaal of een aparte ruimte

1.5 meter afstand houden is mogelijk:

- geef op afstand stapsgewijs instructies
- bel 112 indien nodig

1.5 meter afstand houden is niet mogelijk:

- handschoenen + gelaatsbescherming aandoen
- slachtoffer instrueren om (chirurgisch) mondmasker aan te doen

afstand houden is niet mogelijk en er zijn geen handschoenen en maskers beschikbaar:

- 112 bellen
- instructies dispatching volgen

Na de interventie

- handen grondig wassen en ontsmetten
- alle gebruikte oppervlakken en materialen reinigen en ontsmetten
- de ruimte verluchten
- namen noteren van andere hulpverleners die eventueel aan de interventie hebben deelgenomen